

tema:

VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

predavač:



Dr Biljana Živaljević


VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

INFEKCIJA GENITALNIH ORGANA

jedan od najčešćih problem sa kojim se susrećemo u svakodnevnom radu!


Mogu biti:

- **Bakterijske**
- **Gljivične**
- **Mešovite**
izazvane
 - chlamydiom trahomatis
 - micoplasmom hominis
 - ureaplasmom urealiticum
- **Virusne**



VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

Najčešće su **GLJIVIČNE INFEKCIJE** izazvane
candidom albicans
[sve češći su **non albicans** sojevi]




VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA



3 od 4
žene
tokom života
ima VVC



40–45%
žena ima dve ili
više epizoda VVC
tokom života



VVC je klasifikovana
■ nekomplikovana (80-90%)
■ komplikovana (10-20%)


VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

VELIKI PROBLEM

- rekurentne vulvovaginalne kandidijazne infekcije.

Najčešći simptomi su:

- iritacija
- svrab
- pojačana beličasta sekrecija
sirastog izgleda
- crvenilo



FAKTORI RIZIKA




VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

ANTIBIOTICI

-dugotrajna primena antibiotika bez primene probiotika!

*uz antibiotike obavezna je upotreba lokalnih ili sistemskih probiotika!!!



+ PROBIOTIK +



obavezna je istovremena primena i **antimikotičnih lokalnih preparata**
koji će sprečiti razvoj gljivice infkcije!!!

VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

TRUDNOĆA

-karakteristična **učestala pojava VVC-a**

- pojačanog znojenja u intimnom predelu
- zbog promene imunoloskog stanja,
- pojedine prokrvljenosti


***Redovnom intimnom negom i upotrebom antimikotika koji se smeju koristiti nakon 1 trimestra trudnoće, mogu se prevenirati VVC i trudnicama olakšati period trudnoće!!!**



VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

GOJAZNOST

poznato je da **candida voli vlažno, slatko i toplo**
te je iz istih razloga jasno zašto se kandidijazna infekcija javlja kod pacijentkinja sa dijabetes melitusom



VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

MENOPAUZA

gubitak estrogena u menopauzi

- menja se pH vagine -

vaginalni epitel postaje atrofičan,
vulnerabilan i podložan infekcijama

PREVENCIJA VVC
u ovom periodu života!!!

- pravilna **intimnom negom**
- **pravovremenom** upotrebom antimikotičnih preparata



Dr Biljana Živaljević:

VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

ŠTA DOVODI DO REZISTENCIJE / RECIDIVA VVC?



SAMOLEČENJE



NEADEKVATNO
LEČENJE

VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

KLOTRIMAZOL

- sintetski imidazolski derivat
- široki spektar antimikotičke aktivnosti
- dostupan je u preparatima za **topikalnu i vaginalnu** primenu
- ispoljava **fungicidnu i fungistatičku** aktivnost



VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

KLOTRIMAZOL

Prema britanskim nacionalnim formulama:
VVC može da se tretira **lokalno kremom**
ali je neizostavno potrebna i
intavaginalna primena leka

Klotrimazol:

- **vaginaleta (200mg klotrimazola)**
- **vaginalni krem (2%)**



VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

KLOTRIMAZOL

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

3 večeri – po 1 vaginaletu uveče pred spavanje!!

KADA SE NE PREPORUČUJE UPOTREBA VAGINAleta?

- tokom menstrualnog ciklusa
- tokom dojenja
- u 1. trimestru trudnoće posle kog je primena dozvoljena!



Tokom upotrebe ovog leka ne treba koristiti:
tampone, intravaginalna ispiranja, spermicide
ili druge vaginalne proizvode!

Dr Biljana Živaljević:

VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

KLOTRIMAZOL

namenjen za **odrasle i decu iznad 12 god**

SAVET:

- vaginalnu tabletu ovlažiti pod mlazom vode da bi se bolje rastvorila u vaginalnoj sredini
- apstinencija od seksualnih odnosa



[Neželjena dejstva se retko opisuju a najčešće je alergija na klotrimazol, koja se manifestuje u vidu svraba, otoka i crvenila!]

VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA

ZAKLJUČAK:

- VVC je **najčešća infekcija** kod žena u različitim životnim dobima!!
- **Pravovremena primena antimikotičnih lekova**
i lečenje oba partnera istovremeno je ključ uspeha u borbi protiv VVC-a!!
- **Komforan** za primenu i **efikasan** u lečenju tegoba su razlog zbog
čega **KLOTRIMAZOL** predstavlja dobru odluku u lečenju VVC-a!!

Dr Biljana Živaljević:

VULVOVAGINALNA KANDIDIJAZA



HVALA NA PAŽNJI!